



ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ ТИПА b

Острое заболевание, поражающее органы дыхания, зрения, слуха, суставы, центральную нервную систему. У 20-40% детей развивается гнойный менингит, 40% заболевших становятся инвалидами. Болеют в основном дети от 2-х месяцев до 5 лет.

Возбудитель – бактерия, гемофильная палочка типа b.

Источник заражения: больной человек или бактерионоситель. Длительность носительства может быть от нескольких дней до нескольких месяцев и не зависит от состояния иммунитета. Бактерии локализуются на слизистой оболочке носоглотки, большинство носителей не имеют никаких симптомов заболевания.

Путь передачи: воздушно-капельный путь. Дети первого года жизни могут заражаться контактным путем.

Инкубационный период. От 2-х до 12 суток.

Клиническая картина. Симптомы заболевания зависят от локализации воспалительного процесса и того, остался ли он локальным или стал генерализованным. Часто наблюдаются повышение температуры, озноб и слабость. Легкие формы болезни могут протекать под маской ОРВИ, однако, и в этом случае возможно возникновение синусита, гайморита, бронхита или отита. Самой тяжелой формой инфекции является гнойный бактериальный менингит, последствиями которого могут быть нейросенсорная тугоухость, расстройства речи, задержка развития. Большую опасность представляет и эпиглоттит – острое воспаление надгортанника и преддверия гортани с обструкцией дыхательных путей. Также гемофильная инфекция может протекать в таких серьезных формах как пневмония, миокардит, артрит, остеомиелит, сепсис.

Осложнения: отек головного мозга, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, септический шок.

Профилактика. 1-я вакцинация ребенка проводится в 3 мес., 2-я - в 4,5 мес., 3-я - в 6 мес., Вакцинация ребенка проводится в 12 мес., ревакцинация - в 6 лет, в соответствии с Национальным календарем прививок.

С профилактической целью важно проводить проветривание помещения, регулярную влажную уборку дома.

